HYALUAL®

INSTITUTE

EL EXPERTO DE CALIDAD DE LA PIEL

REDERMALIZACIÓN DIRECTRICES DE PROCEDIMIENTOS CLAVE

HYALUAL INSTITUTE

CAMBIOS INDUCIDOS POR LA EDAD DE LA PIEL EN LA ZONA PERIORBITAL

PROTOCOLO

REDERMALIZACIÓN

Técnica de inyección intradérmica punto por punto (Técnica 1).

Productos

Hyalual® (Xela Rederm®) 1.1 %, 1.8 % (dependiendo de la apariencia de las arrugas, la piel y la sequedad) d = 3-4 mm, la distancia entre las inyecciones es de 0,3-0,4cm
Cantidad del producto: 1-2 ml

1er procedimiento — 2 semanas más tarde — 2 procedimiento — 2 semanas más tarde — 3 procedimiento

TÉCNICA 1



PROCEDIMIENTO

HYALUAL® INSTITUTE

EFICACIA CLÍNICA*



Las mediciones de perfilometría muestran una mejora de la superficie cutánea en la zona periorbital. El análisis estadístico de los datos recogidos (antes del 1er tratamiento, inmediatamente después del 2º tratamiento y 2 semanas después del tercer tratamiento) demuestran el avance en las propiedades físicas de la piel después del tratamiento de Redermalización.

CONCLUSIÓN

Luego del tratamiento de Redermalización, y habiéndose aplicado la técnica Punto por Punto, se puede asociar claramente una mejora de la piel con respecto a los cambios relacionados con la edad en el área periorbital, como por ejemplo: elasticidad, nivel de humedad, la apariencia física, y la textura de la piel.

* Conclusión sobre las pruebas post-clínicas del dispositivo médico: implantes inyectables basados en ácido hialurónico de marca Hyalual (Yutskovsky's Professorial Clinic, Ltd, 2012)

RESULTADO

Área periorbital antes del procedimiento de redermalización

Arrugas periorbitales moderadas, reducción de la opresión cutánea y el aumento en la Hidratación.



Área periorbital inmediatamente después del procedimiento de redermalización

Mejora del tono de piel, elasticidad y nivel de humedad.

Área periorbital 14 días después del 3er procedimiento de redermalización

Reducción de la aparición de arrugas periorbitarias. Superficie lisa, mayor textura y elasticidad.

HYALUAL® INSTITUTE

CAMBIOS INDUCIDOS POR LA EDAD DE LA PIEL DEL CUELLO Y DEL ESCOTE

PROTOCOLO

REDERMALIZACIÓN

Técnica de inyección intradérmica punto por punto (Técnica 2).

Productos

Hyalual® (Xela Rederm®) 1.1 %, 1.8 % d = 3-4 mm, la distancia entre las inyecciones es de 0,5-1 cm. Cantidad del producto por área: 1-2 ml

1er procedimiento

2º procedimiento

2 semanas más tarde

TÉCNICA 2





PROCEDIMIENTO

HYALUAL INSTITUTE

CAMBIOS INDUCIDOS POR LA EDAD EN LA PIEL DEL CUELLO Y DEL ESCOTE

REDERMALIZACIÓN COMBINADA

Inyecciones intradérmicas utilizando la técnica de punto-por-punto y la técnica lineal

Productos

Hyalual® (Xela Rederm®) 1.1 % d = 3-4 mm, técnica punto por punto, la distancia entre las inyecciones es de 0,7-1 cm. Cantidad del producto en la zona del cuello: 1-2 ml

Hyalual® (Xela Rederm®) 1.8 % el entrecruzamiento usando la aguja en el escote. Cantidad del producto: 2 ml

3º procedimiento

2 semanas más tarde

TÉCNICA 3



PROCEDIMIENTO

HYALUAL® INSTITUTE

EFICACIA CLÍNICA*

EL EXAMEN DE ULTRASONIDO DEL ESCOTE (paciente B, 42 años)

Un escote antes del procedimiento de redermalización.

Alteración visible de la epidermis. Echogenicidad débil de la dermis subepidérmica. Fibras hiperecogénicas en las partes más bajas de la dermis.



Inmediatamente después del procedimiento de redermalización.

Los focos hipoecogénicos son visibles sin contornos precisos en todo el patrón de la dermis con la subtilización de estructuas fibrosas.



14 días después del 3er procedimiento de redermalización.

Aumento de la estructuración general de la dermis y de la red capilar de la piel. La dermis está engrosada; la densidad acústca se incrementa, con la distribución uniforme de la señal de eco y la disposición lineal compacta de las fibras. No hay signos de infiltración, no se observan cambios en el patrón vascular.



HYALUAL® INSTITUTE

EFICACIA CLÍNICA*



RESULTADOS DE CORNEOMETRÍA



Exámenes de Ultrasonido, Corneómetro y Perfilómetro de la piel confirman la alta eficacia de la Redermalización.
Tras el 2º tratamiento, se observó la distribución del producto en la dermis en las áreas de administración, en particular el aumento moderado del espesor y densidad acústica de la dermis. 2 semanas después del 3er tratamiento, el producto administrado ya no era visible en la dermis; se detectó el aumento en el espesor y la densidad acústica, con la distribución uniforme de la señal de eco y el ajuste compacto lineal de las fibras.

CONCLUSIÓN

Redermalización en pacientes con cambios involutivos del cuello y escote: restaura y aumenta el nivel de hidratación y elasticidad de la piel, suaviza la piel y puede potenciar la síntesis de proteínas estructurales de la piel.

* Conclusión sobre las pruebas post-clínicas del producto médico: implantes inyectables basados en ácido hialurónico de marca Hyalual (Yutskovsky's Professorial Clinic, Ltd, 2012)

RESULTADO

La piel del escote antes del procedimiento de redermalización

Aumento de la textura de la piel (aparición de líneas dérmicas), signos de reducción de la hidratación de la piel, hiperqueratosis moderada.

La piel del escote después del 2º procedimiento de redermalización

Se reducen los signos de hiperqueratosis, se observa una mejor firmeza de la piel y un aumento en la hidratación.

La piel del escote 14 días después del 3er procedimiento de redermalización

Mejoró significativamente la firmeza de la piel y la hidratación, se observa también, una mejora tangible de las extructuras vasculares de la piel.

HYALUAL® INSTITUTE

CAMBIOS INDUCIDOS POR LA EDAD DE LA PIEL EN LAS MANOS: LA ATONÍA, LA SEQUEDAD, LAS ARRUGAS

PROTOCOLO

REDERMALIZACIÓN

Inyecciones intradérmicas utilizando la técnica de punto por punto, micro bulbos (Técnica 4).

Productos

Hyalual® (Xela Rederm®) 1.1% - antes de los 35 años d = 3-4 mm, la distancia entre las inyecciones es de 0.5-1 cm. Cantidad del producto: 2 ml

Hyalual® (Xela Rederm®) 1.8 % - a la edad de 35 a 45 años. Cantidad del producto: 2 ml

1er procedimiento



Técnica 4

REDERMALIZACIÓN COMBINADA

Inyecciones intradérmicas utilizando la técnica de punto por punto y la técnica de vectores utilizando 25G Hyalual cánula romo (Técnica 5).

Productos

Hyalual® (Xela Rederm®) 1.8 %
Técnica de micro bulbo, la distancia entre las inyecciones es de 0.5 cm. Cantidad del producto: 2 ml

Hyalual® (Xela Rederm®) 2.2 %
Técnica vectorial, desde un punto de inyección. Cantidad del producto: 2 ml

2º procedimiento 2 semanas más tarde



Técnica 5

REDERMALIZACIÓN UTILIZANDO TÉCNICA VECTORIAL

utilizando 25G Hyalual cánula romo (Técnica 6).

Productos

Hyalual® (Xela Rederm®) 2.2 %
Técnica vectorial, desde un punto de inyección
Cantidad del producto: 2 ml

3er procedimiento 2 semanas más tarde



Técnica 6

PROCEDIMIENTO

HYALUAL®
INSTITUTE

EFICACIA CLÍNICA*

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE HUMEDAD



El curso de los procedimientos de redermaización con la administración de Hyalual® (Xela Rederm®) 2.2 % causó el aumento del contenido de humedad.

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE ELASTOMETRIA



La elasticidad de la piel en las manos después del curso de los procedimientos de redermalización con Hyalal® (Xela Rederm®) 2.2% aumentó un 20.3%.

CONCLUSIÓN

La redermalización en pacientes con cambios de piel en las manos mejora significativamente la elasticidad, hidratación y calidad de la piel. La piel se vuelve visiblemente más lisa y elástica.

**Opinión de expertos sobre los resultados de los ensayos clínicos del dispositivo médico: Implante inyectable a base de ácido hialurónico Hyalual (Xela Redem®), jeringa 1,1%, 1,8% y 2,2%, en el Centro de Laboratorio de Pruebas del Hospital Clínico Central de la Academia Rusa de Ciencias, Moscú, 2014.

RESULTADO

antes

después

2 semanas más tarde

4 semanas más tarde

7 semanas más tarde

HYALUAL
INSTITUTE

PROFI DELUX CUIDADO POST-PROCEDIMIENTO

SPRAY PARA EL CUIDADO POST-PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE TRATAMIENTOS ESTETICOS INVASIVOS LA POSIBILIDAD DE DISFRUTAR DE UN LIGERO PERÍODO DE RECUPERACIÓN Y DE UN ALIVIO RÁPIDO TRAS UN PROCEDIMIENTO

PROFI DELUXE COMPOSICIÓN:

ÁCIDO HIALURÓNICO

Propiedades del Ácido Hialurónico:

anti-inflamatoria
mantiene la humedad natural de la piel
estimulación de la migración celular y activación de la proliferación de fibroblastos y macrófagos

ÁCIDO SUCCÍNICO

Propiedades del ácido succínico:

antioxidante
impulsa la regeneración de la piel con energiá

AGUA ALTAMENTE PURIFICADA

INDICACIONES:

Reducción del período de recuperación post-procedimiento, reducción de los efectos secundarios potenciales, tales como: sensación de ardor, enrojecimiento, hinchazón, así como minimización de complicaciones (infección, discromía, fibrosis).

MÉTODO DE APLICACIÓN:

Profi DeLux se debe aplicar 3-4 veces al día y se utiliza en promedio durante aproximadamente 3 segundos por aplicación. Aplique Profi DeLux inmediatamente después del procedimiento a una distancia de 25-35cm de la superficie de la piel.

Con el fin de lograr una aplicación uniforme de la pulverización y evitar el goteo del producto, recomenda-mos mover un aerosol spray paralelo a la superficie de la piel.

HYALUAL®
INSTITUTE

NOTAS:







www.hyalual.com